

GIPS - INFO

Liebe Patienten!

Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig durch. Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Halten Sie Ihren Gipsarm (oder Ihr Gipsbein) immer hoch, möglichst über Herzhöhe. Legen Sie die betreffende Extremität (Körperteil) nachts auf ein dickes Kissen.
2. Kühlen Sie, wenn möglich, die betroffene Stelle mit einem Kühlelement
3. Gehen Sie am Tag nach der Gipsanlage zu Ihrem behandelnden Hausarzt bzw. zu dem Krankenhausarzt zur Gipskontrolle.
4. Beobachten Sie die Extremität
 - geschwollene oder bläulich verfärbte Finger/Zehen
 - zunehmende Blässe von Fingern/Zehen
 - starke Schmerzen in der betroffenen Extremität
 - Kältegefühl in Zehen/Fingern
 - abnehmendes/ausfallendes Gefühl bzw. Beweglichkeit oder Nichteinsetzen derselben z.B. nach örtlicher Betäubung oder Narkose

Haben Sie eines der beschriebenen Probleme oder sind Sie sich unsicher, suchen Sie bitte umgehend Ihren Hausarzt bzw. Krankenhausarzt auf!